

EXPERIENCIA DE DOS DECADAS CON APITOXINA INYECTABLE PARA USO MEDICO EN DISTINTAS PATOLOGIAS

Dr. Roberto Grand
Rosario, Santa Fe, Argentina

Todos los tratamientos se instalaron con apitoxina para uso medico inyectable, provista por Farmacia del Lago, Las Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, Argentina. Las dosis, vías de aplicación y periodicidad de las aplicaciones variaron de acuerdo a la patología que se trataba y a la evolución del paciente. Estos tratamientos se hicieron en algunos casos utilizando solo Apitoxina y en otros, con la utilización de medicamentos coadyuvantes y la indicación de fisioterapia, kinesioterapia, controles de laboratorio, radiológicos, etc. Para verificar la evolución de los pacientes.

Pacientes

- Durante 17 años fueron tratados 2.800 pacientes con aplicación de apitoxina para uso medico, con seguimiento periódico clínico, laboratorio y radiológico.

Edad

- La edad de los pacientes osciló entre 35 y 80 años.

Sexo

- Femenino: 75%
- Masculino: 25%

En estos totales se consideran los casos que llegaron al final del tratamiento y que fueron seguidos con estudios complementarios.

Patologías Tratadas

Artrosis	2.044 (73%)
Artritis reumatoide	336 (12%)
Hernias de disco	252 (9%)
Pinzamientos	84 (3%)
Neuralgias	56 (2%)
Esclerosis múltiple	28 (1%)

Posologia

Esquema nº 1

0,3 a 0,5ml. de Apitoxina Apis v.p 5x tres veces por semana durante un mínimo de dos meses.

0,3 a 0,5ml. de lamisca atenuación, dos veces por semana (tiempo según evolución)

0,3 a 0,5ml. de la misma atenuación, una vez por semana durante dos meses y luego, el alta.

Esquema nº 2

0,3 a 0,5ml de Apitoxina Apis v.p 5x pasando un día y luego espaciando de acuerdo a la evolución.

Esquema nº 3

0,3 a 0,5ml de Apitoxina v.p 5x todos los días en procesos agudos, y luego espaciando de acuerdo a evolución.

Esquema nº 4

0,2 a 0,4 ml de Apitoxina Apis v.p 4x, utilizando las mismas frecuencias.

Esquema para Esclerosis Multiple

0,5ml. de Apitoxina Apis v.p 3x cada 12 horas (dos veces por día) durante dos a tres meses. Luego, 0,5ml. de la misma Apitoxina cada 24 horas durante seis meses y, mas adelante, de acuerdo a la evolución 0,5ml. pasando un día. (en estas patologías el tiempo de tratamiento es incierto; en parte por la evolución irregular del paciente y en otra por la experiencia escasa).

Complemento de los tratamientos

- Regeneradores de cartílago.
- Fisis y kinesioterapia (fundamental en esclerosis múltiple).
- Hábitos higiénicos-dietéticos.
- Controles de laboratorio (colesterol, triglicéridos, acido úrico, glucemia).
- Controles radiológicos.

Resultados

Positivos: 70%

De estos, un 60% con mejoría clínica, mejor calidad de vida, sin dolor y con movilidad articular sensiblemente mejorada. Un 40% con mejoría radiológica, es decir, sin avance del proceso artrósico luego de varios años.

Poca o escasa mejoría: 20%

Resultados negativos: 10%

Reacciones alérgicas: Ninguna

PRIMER CONGRESO ARGENTINO DE APITOXINOTERAPIA

En resumen, excelentes resultados con la utilización de la apitoxina inyectable para uso medico durante dos décadas de tratamientos de las patologías mencionadas.

Dr. Roberto Grand

rgrand@arnet.com.ar//robertogrand@hotmail.com