

USO TERAPEUTICO DEL FACTOR DE TRANSFERENCIA EXPERIENCIAS CLINICAS

A.- ENFERMEDADES INFECTO-CONTAGIOSAS

1.- Herpes Zoster.....	1U* c/48horas.....	2 a 3 U*
2.- VHS tipo 1 y 2:		
- Herpes Genital.....	1U c/8 días.....	5 U
Posteriormente.....	1U c//15 días.....	5 U
-Queratitis herpética en fase aguda.....		Úsese igual que Herpes Zoster
-Su uso está recomendado en Herpes genital de repetición con tratamiento similar al anterior.....		
-Queratitis Herpética recidivante.....		Úsese igual que Herpes Zoster
-Gingivostomatitis Herpética y demás afecciones orales.....		Úsese igual que Herpes Zoster
3.- Mononucleosis infecciosa.....		Úsese igual que Herpes Zoster (fase aguda)
(Virus Epstein – Baar).....		y en fase crónica úsese igual que Herpes de repetición
4.- Citomegalovirus (CMV).....	1U c/4 días.....	5 U
- Profilaxis en pacientes inmunocomprometidos (cáncer, Transplantados, SIDA, personas sometidas a tratamiento inmunosupresor).....	Por tiempo indefinido hasta que se restablezca la respuesta inmune	
5.- Síndrome De Fatiga Crónica.....	1U c/8 días.....	15 a 20 U
6.- Hepatitis Virales.....	1U c/3 er día.....	10 a 15 U
7.- Dengue.....	1U c/3 er día.....	hasta remisión del cuadro
8.- Verrugas vulgares multitratadas.....	1U c/8 días.....	5 a 10 U
9.- Tuberculosis.....	1U c/8 días.....	10U
10.- Sinusitis Crónica.....	1U c/8 días.....	5 a 10 U
11.- Infecciones de VRS** de repetición.....	1U c/8 días.....	5 a 10 U
12.- Infecciones Urinarias de difícil manejo.....	1U c/4 días.....	5 a 10 U
13.- Síndrome Diarreico de difícil manejo.....	1U c/8 días.....	5 U
14.- Sepsis.....	2U al inicio.....	1U c/12 horas.....
15.- Diabetes.....	Paciente multiinfectado descompensado.....	1U c/8 días.....
Pie Diabético.....	1U c/8 días.....	5 a 10 U
16.- Osteomielitis Crónica.....	1U c/4 días.....	5U
17.- Candidiasis.....		Úsese igual que para CMV
18.- Otras Micosis oportunistas.....	1U c/4 días.....	5 U
19.- Micosis Profunda.....	1U c/8 días.....	10-15 U
20.- SIDA		
- Cuadros activos por agentes oportunistas.....	1U c/4 días.....	Hasta remisión del cuadro
- Profiláctico.....	1U c/8 días.....	Indefinido
- Seropositivo asintomático.....	1U c/15 - 30 días.....	Indefinido
21.- Leishmaniasis.....	1U c/6 días.....	20-30U
22.- Toxoplasmosis.....	1U c/8 días.....	15 U

B.- ENFERMEDADES CON PERDIDA DE REGULACION DE LA RESPUESTA INMUNE

23.- Asma Bronquial.....	1U c/8 días.....	10 U
Crisis Asmática.....	1U c/ 3 er día.....	hasta salir de la crisis
24.- Psoriasis multitratada.....	1U c/8 días.....	20 U
25.- Inmunodeficiencias de la respuesta inmuno celular.....	1U c/8 días.....	10-20 U

C.- NEOPLASIAS

26.- En pacientes con Radioterapia y Quimioterapia.....	1U c/ 8 días.....	hasta termino de estos tratamientos
Posteriormente valora la aplicación de.....	1U c/15-30 días.....	Manteniéndose por un tiempo prolongado
- Pacientes que van a ser sometidos a cirugía.....	3U antes de la cirugía.....	3U después de la cirugía
- Cirugía de alto riesgo.....	2U antes de la cirugía.....	1U c/3er día 5U (pacientes con fracturas expuestas, pacientes infectados, inmunosuprimidos) después de la cirugía)

*U= Unidad

** VRS= Vías Respiratorias Superiores

Es importante considerar que el factor de transferencia (FT) es una terapia adyuvante o complementaria al tratamiento convencional u ortodoxo. La experiencia del médico en el manejo de las diferentes patologías aquí descritas será un elemento toral para el análisis de la dosis-respuesta de sus pacientes, por lo que se podría modificar estos esquemas de acuerdo al juicio del clínico.

-Estamos a sus órdenes para aclaraciones, dudas y asesoría inmunológica de su paciente.